

LYCIDES AFRICAINS NOUVEAUX

par M. PIC

Je donne, pour prendre date, les diagnoses de divers Lycides communiqués par le Dr. Gestro et qui seront ultérieurement plus longuement décrits avec des détails plus précis d'habitat.

Les types font partie des riches collections du Musée Civique de Gênes et quelques co-types figurent aussi dans ma collection (¹). Les présentes nouveautés proviennent des récoltes faites par le grand explorateur L. Fea, sauf deux qui sont respectivement dédiées aux voyageurs qui les ont recueillies.

Fernandum n. gen. *Capite supra distinete, rostro nullo, tuberculis antennarum conjunctis, prominulis; antennis approximatis, validis, 10 articulatis, articulo 2.^e breve, 3.^e grande et robusto, 4.^e dentato, ceteris longe pectinatis; thorace breve, antice subtruncato, medio subcarinato; elytris fortiter 4-coslati, intervallis punctatis; pedibus brevibus, parum compressis.*

Ce nouveau genre rappelle un peu de faciès *Libnetis* Wat. mais en est très distinct par la structure de la tête et celle des antennes ainsi que par la sculpture élytrale.

Fernandum minutum n. sp. *Elongatum, fere opacum, griseo pubescente, ochraceo - flavum, oculis nigris. Long. 4 mill. Ile Fernando Poo (L. Fea).*

Stadenus biformatus n. sp. *Oblongo-elongatus, nitidus, parum pubescens, niger, articulo ultimo antennarum, thorace, scutello elytrisque antice late rufo - ochraceis. Long. 7 mill. Ile Principe (L. Fea).*

(¹) *Adoceta prescutellaris*, *Planeteros bicoloripes*, *Lycus excavatus* et *Ruspolii*; *Cladophorus diversipes* et *Gestro*.

Espèce caractérisée par la structure du prothorax qui a, au lieu d'une longue aréole médiane, deux fossettes allongées.

Adoceta Feai n. sp. *Angustata, nitida, breve pubescens, nigra, thorace rubro-testaceo, medio nigro lineato, elytris rubris, apice breve nigro notatis.* Long. 11 mill. Ile Fernando Poo (L. Fea).

Voisin de *A. brevilineata* Pic, en diffère, à première vue, par les élytres sans trait noir prescutellaire et plus pubescents.

Adoceta prescutellaris n. sp. *Elongata, nitida, breve pubescens, nigra, thorace lateraliter elytrisque ochraceis, his ad scutellum minute et apice sat breve nigro notatis.* Long. 8 mill. Ile Fernando Poo (L. Fea).

Voisin de *Barkeri* Brg., s'en distingue, à première vue, par les élytres ochrés, plus brièvement marqués de noir au sommet.

Planeteros bicoloripes n. sp. *Elongatus, nitidus, sat breve pubescens, ochraceus, articulis 3-7 antennarum, abdomine, pedibus pro parte elytrisque apice breve nigris.* Long. 5-6 mill., Fernando Poo (L. Fea).

Voisin de *P. Escalerae* Brg. s'en distingue, à première vue, par les antennes à derniers articles testacés et les tibias testacés à la base.

Planeteros Bayoni n. sp. *Elongatus, nitidus, breve pubescens, niger, thorace, elytris ad basim sat breve pedibusque pro parte testuceis.* Long. 7 mill. Uganda (Dr Bayon).

Plus étroit que le précédent avec les élytres en majeure partie foncés.

Lycus excavatus n. sp. ♂ *Testaceus, pedibus, elytris ad scutellum breve, apice parum late et sinuate nigris; elytris antice excavatis, humeris valde prominulis, postice rotundato-ampliatis, ad suturam longe dentatis.* Long. 15-18 mill. Guinée Portugaise (L. Fea).

Voisin de *L. aculeatus* Brg., élytres de forme différente à épaules plus élevées et suture à dent plus robuste et plus courte.

Lycus Ruspolii n. sp. ♂ *Elongatus, postice paulo dilatatus, niger, thorace-lateraliter ochraceo, elytris in disco ochraceo diverse lineatis, his apice separatis rotundatis.* Long. 12-13 mill., Afrique Or. (Ruspoli).

Espèce voisine de *L. flammatus* Brg., s'en distingue par la forme moins élargie postérieurement et par les élytres plus largement foncés.

Cladophorus maculatipes n. sp. ♂ *Oblongo-elongatus, parum nitidus, et paulo pubescens, ochraceus, oculis, antennis pedibusque pro parte, abdomine et elytris apice breve nigris; antennis flabellatis.* Long. 9-11 mill. Ile Fernando Poo (L. Fea).

Par son prothorax transversal et son faciès se rapproche de *C. latithorax* Brg.; il s'en distingue, à première vue, par les pattes en majeure partie claires.

Cladophorus Feai n. sp. ♂ *Angustatus, parum nitidus et paulo pubescens, testaceus; thorace non transverso, in medio pedibusque rufo-brunneis, elytris apice sat breve piceis; antennis flabellatis.* Long. 7 mill. Ile Fernando Poo (L. Fea).

Voisin de *C. Bolivari* Brg. et présentant une coloration générale moins foncée des membres.

Cladophorus Gestroi n. sp. ♂, ♀. *Elongatus, opacus, paulo pubescens, niger, aliquot pro parte piceus, supra ochraceus, elytris apice breve nigro notatis, articulo 1.º antennarum plus minusve rufo, ultimo apice flavo; thorace robusto, antice sinuato, lateraliter indistincte areolato; antennis depressis, flabellatis ♂, aut pectinatis ♀.* Long. 8-9 mill. Ile Fernando Poo (L. Fea).

Diffère de *C. macer* Brg. par la forme moins allongée et la structure différente du prothorax.

Cladophorus curtenotatus n. sp. ♀. *Elongatus, parallelus, opacus, paulo pubescens, nigro-piceus, femoribus ad basim et articulo ultimo antennarum apice testaceis, thorace, scutello elytrisque ochraceis, his apice minute nigro-piceo notatis; thorace robusto, antice sinuato, 7-areolato; antennis depressis, pectinatis.* Long. 8 mill. Fernando Poo (L. Fea).

Voisin du précédent, en diffère par la forme plus étroite et les élytres très brièvement foncés au sommet.

Xylobanus Feai n. sp. *Angustatus, opacus, niger, capite rufo notato, femoribus ad basim et articulo u timo antenarum testaceis, thorace elytrisque ochraceis, illo postice nigro notato, his apice parum late nigris; thorace non transverso, 7-areolato; intervallis elytrorum latis, sat regulariter plicatis.* Long. 11 mill. Guinée Portugaise (L. Fea).

Voisin de *X. pentagonus* Brg., sculpture des élytres différente, à areoles très larges.